

VACINAS E AMAMENTAÇÃO

Imunoglobulina anti-D (anti-RH)	● Uso compatível com a amamentação.
Imunoglobulina anti-hepatite B	● Uso compatível com a amamentação.
Imunoglobulina antirrábica	● Uso compatível com a amamentação.
Imunoglobulina antitetânica	● Uso compatível com a amamentação.
Imunoglobulina humana	● Uso compatível com a amamentação.
Soro antiaracnídico	● Uso compatível com a amamentação.
Soro antidiftérico	● Uso compatível com a amamentação.
Soro antiescorpiônico	● Uso compatível com a amamentação.
Soro antiofídico	● Uso compatível com a amamentação.
Contra Antrax	● Uso criterioso durante a amamentação. Não há dados sobre segurança para uso durante o período da lactação.
Contra cólera	● Uso criterioso durante a amamentação. Não há dados sobre segurança para uso durante o período da lactação.
Contra Doença de Lyme	● Uso compatível com a amamentação.
Contra difteria, tétano e coqueluche (DPT)	● Uso compatível com a amamentação.
Contra febre amarela	● Uso criterioso durante a amamentação. Não há dados sobre segurança para uso durante o período da lactação.
Contra febre tifóide	● Uso compatível com a amamentação.
Contra <i>Haemofilus influenza</i>	● Uso compatível com a amamentação. Porém, não há indicação para uso em adultos.
Contra hepatite A	● Uso compatível com a amamentação.
Contra hepatite B	● Uso compatível com a amamentação.
Contra gripe (Influenza)	● Uso compatível com a amamentação.
Contra meningococo C	● Uso compatível com a amamentação.

Contra papilomavírus humano (HPV)	● Uso compatível com a amamentação.
Contra poliomielite (oral ou injetável)	● Uso compatível com a amamentação.
Contra raiva	● Uso criterioso durante a amamentação. Não há dados sobre segurança para uso durante o período da lactação.
Contra rubéola	● Uso compatível com a amamentação.
Contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR ou tríplice viral)	● Uso compatível com a amamentação.
Contra tétano	● Uso compatível com a amamentação.
Contra tuberculose (BCG)	● Uso compatível com a amamentação.
Contra varicela	● Uso compatível com a amamentação.
Contra varíola	● Uso criterioso durante a amamentação. Não há dados sobre segurança para uso durante o período da lactação. Uso em lactantes indicado apenas em situações de emergência.
Teste tuberculínico (PPD)	● Uso compatível com a amamentação.